

Vacunas COVID-19

¿Por qué debo obtener la vacuna COVID-19?

Las vacunas han protegido de forma segura a millones de personas y han evitado que estén muy enfermas, sean hospitalizadas o mueran a causa de COVID-19. La protección que se obtiene con la vacuna es menos riesgosa que contraer COVID.

Vacunas COVID-19 y refuerzos para la mayoría de las personas.

La vacuna de Pfizer está disponible tanto para niños como para adultos:

- Los niños de 6 meses a 4 años pueden obtener 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, y una tercera dosis 8 semanas después. Las 3 dosis son necesarias para completar la serie.
- Los mayores de 5 años pueden obtener 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, y una dosis de refuerzo 5 meses después.

La vacuna Moderna está disponible tanto para niños como para adultos:

- Los niños de 6 meses a 17 años pueden obtener 2 dosis con 4 semanas de diferencia.
- Los adultos de 18 años o más pueden obtener 2 dosis, con 4 semanas de diferencia, y una dosis de refuerzo 5 meses después.

La vacuna de Johnson and Johnson (J&J) está disponible para adultos:

- Los adultos de 18 años o más pueden obtener una dosis y luego una vacuna de refuerzo después de 2 meses. Las personas que obtuvieron J&J como dosis primaria y de refuerzo, pueden obtener una segunda dosis de refuerzo 4 meses después.

Si está inmunodeprimido, debe obtener dosis adicionales.

Las personas que deberían obtener una dosis extra son las que:

- Tienen un sistema inmunológico debilitado
- Han recibido un trasplante de órganos o células madre
- Tienen cáncer
- Tienen el VIH.
- Tienen afecciones crónicas como la diabetes o enfermedades del corazón, el hígado, los riñones y los pulmones.

Si considera que puede pertenecer a este grupo, hable con un médico o proveedor de servicios médicos. Las personas de este grupo pueden obtener dosis primarias y de refuerzo adicionales. Los esquemas de vacunación para las personas inmunocomprometidas se encuentran en la página siguiente.

Si es mayor de 50 años, debe obtener un segundo refuerzo.

Los adultos mayores de 50 años, tanto inmunodeprimidos como no inmunodeprimidos, pueden optar por obtener una segunda vacuna de refuerzo 4 meses después de la primera.


Mezcla y combinación de vacunas de refuerzo.

Los adultos mayores de 18 años pueden obtener cualquier marca de vacuna como primera vacuna de refuerzo. Para obtener la mejor protección, se recomienda obtener Pfizer o Moderna. Los niños no pueden combinar las vacunas y no todos los niños pueden obtener un refuerzo en este momento.


Consulte el cronograma de cada vacuna en la siguiente página.

Cronograma de vacunación para la mayoría de las personas

Pfizer
(edades de 6 meses a 4 años)



Pfizer
(A partir de 5 años)




4 meses


2.º refuerzo

Las personas de 50 años o más deben obtener un segundo refuerzo.

Moderna
(edades de 6 meses a 17 años)



Moderna
(A partir de 18 años)




4 meses

2.º refuerzo

Las personas de 50 años o más deben obtener un segundo refuerzo.

Johnson & Johnson
(A partir de 18 años)



4 meses

2.º refuerzo


- Las personas de 50 años o más deben obtener un segundo refuerzo.
- Las personas de 18 años o más que recibieron J&J como dosis primaria y de refuerzo, pueden obtener un segundo refuerzo que es Pfizer o Moderna.

Cronograma de vacunas para inmunocomprometidos


Pfizer
(edades de 6 meses a 4 años)




Pfizer
(edades de 5 a 11 años)




Pfizer
(A partir de 12 años)



Moderna
(edades de 6 meses a 17 años)



Moderna
(A partir de 18 años)



Johnson & Johnson
(A partir de 18 años)

